

DAYTONA

Lolium multiflorum L.



İtalyan Çimi (Ryegrass)

*Kazancınızı arttırmak ister misiniz?
Would you like to increase your profit?*

tasaco[®]

0 242 249 46 46 | www.tasaco.com

DAYTONA

Lolium multiflorum L.

İtalyan Çimi (Ryegrass)



Tarımsal Özellikleri

Gelişme Tabiatı	Alternatif
Büyüme Şekli	Yarı dik
Olgunlaşma Zamanı	Orta erkenci
Biçim Sayısı	4 - 6
Bitki Boyu	110 - 120 cm
Yatma Durumu	Dayanıklı
Don ve Soğuk Dayanımı	İyi
Verim	Yüksek

Kuru Ot Kalite Özellikleri

Sınıfı	Tetraploid
Kullanım Şekli	Yeşil ot, kuru ot ve silajlık
Protein	Yüksek (deneme ortalamasının % 13,8 üzerinde)
Ham Yağ	Yüksek (deneme ortalamasının % 13,7 üzerinde)
ADF	Düşük (deneme ortalamasının % 1,2 altında)
NDF	Düşük (deneme ortalamasının % 2,0 altında)

Hastalıklara Dayanıklılık

Fusarium	İyi
Solgunluk	İyi

Önerildiği Bölgeler ve Yetiştirme Koşulları

Ekim Bölgeleri	Akdeniz, Ege ve Güney Marmara
Ekim Alanları	Sulanabilir taban ve yarı taban araziler
Ekim zamanı	15 Ekim - 15 Aralık
Ekim Miktarı	4 - 5 kg/da
Gübreleme	Tabana 3 - 5 kg Fosfor (P) İl çıkıştan 15 - 20 gün sonra 5 - 7 kg Azot (N) Daha sonraki her biçimden sonra 5 - 7 kg Azot (N)

Broşür içerisindeki bilgiler Tasaco Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yürüttüğü denemelerden elde edilen sonuçlara göre düzenlenmiş olup verilen bilgiler, ilgili kişilere rehber alma niteliğindedir. Ürünün yetiştirilmesinde, bölgesel koşullara ve üreticilere göre farklı uygulamaların yapılması gerekebilir. Bu sebeple üreticilerin farklı sonuçlar alması nedeni ile meydana gelebilecek kayıp ve zararlarından Tasaco Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. Daha fazla bilgi için, firmamızla iletişime geçebilirsiniz.



Variety Characteristics

Growing type	alternative type
Growth habit	semi-erect, vigorous
Maturity cycle	mid early
Cutting rate	4 - 6
Plant height	110 - 120 cm
Lodging	resistant
Tolerances	high towards low temperatures
Yield performance	high

Dry Hay Quality

Type	tetraploide
Usage	green hay, dry hay, excellent for silage
Pure Protein	high
Fat	high
ADF	low
NDF	low

Disease Tolerances

Fusarium	high
Wilt disease	high

Recommended Growing Conditions

Sowing region	Mediterranean, Aegean and South Marmara
Sowing field	Rainfed and sloppy fields
Sowing time	15th October - 15th December
Seed rate	40 - 50 kg/ha
Fertilizing	Base dressing 3-5 kg Phosphorus (P) 15-20 days after first emerge 5-7 kg Nitrogen(N) After each cutting 5-7 kg Nitrogen (N)

All given information are based on trial results, which have been set up and evaluated by Tasaco Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. and as reference for interestees. Depending on local conditions and growers it may be necessary to apply adjusted different methods. Accordingly, Tasaco Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. is not responsible for any loss or damages caused by different results of growers. For further information you are free to contact us.

Tasaco Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cadde
No: 10 07190 - Döşemealtı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: 0 242 249 46 46 • Fax: 0 242 249 46 00

tasaco®
www.tasaco.com